Hier eigener Name (Stempel)

BCRT Reisepraxis GmbH

Gesellschafter: Prof. Dr. med Tomas Jelinek
Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg,
Köln, München, Münster, Stuttgart

www.bcrt.de

Reiseziel: XXX Abreise 30.09.26

Name: Mustermann, Muster **Geb.-Datum:** 30.05.73

Die nachfolgenden Empfehlungen stützen sich auf Ihre Angaben.
Hierbei wurden Reiseziel, Reisestil und Reisedauer sowie vorhandener Impfschutz berücksichtigt.

	Art der Impfung	Letzte Impfung	Terminvorschlag	Anmerkungen
✓	Tet/Diph/Pert/Polio	25.5.25		▪ Grundimmunisierung: 3 Impfungen ▪ Auffrischung: 1 Impfung alle 10 Jahre ▪ Polio ggf. als Einreisebedingung
✓	Masern/Mumps/Röt.	2x	1) 2)	▪ Impfung für jeden empfohlen! (2 Injektionen im Abstand von mind. 4 Wochen, Impfschutz lebenslang)
	Covid-19			▪ Impfung für Risikopersonen empfohlen (Impfabstand je nach Impfstoff)
X	Gelbfieber		8.1.26	▪ Impfschutz lebenslang, Impfung nur an Gelbfieber-Impfstellen möglich! ▪ Bescheinigung lebenslang gültig nach 10 Tagen (z.T. nur 10 Jahre)
( )	Dengue		1) 2)	▪ Lebendimpfung (2 Injektionen im Abstand von mind. 3 Monaten, Impfschutz nach 1. Impfung 81%)
	Chikungunya			▪ Einmalgabe Lebendimpfstoff oder Totimpfstoff
X	Typhus		15.1.26	▪ Je nach Impfstoff: 1 Injektion oder 3x1 Kapsel an den Tagen 1,3,5 einnehmen (off label: 4 Kps. an den Tagen 1,3,5,7) **Kapseln kühl lagern!** ▪ Impfschutz: 3 Jahre (4 Kapseln off label auch 5 Jahre)
✓	Hepatitis A	20.3.24	1) 2)	▪ Grundimmunisierung: 2 Impfungen im Abstand von mind. 6 Monaten ▪ Impfschutz: mind. 40 Jahre (sehr wahrscheinlich lebenslang) ▪ Schutz beginnt wenige Tage nach der 1. Impfung
X	Hepatitis B		1) 2) 3)	▪ Grundimmunisierung: 2 Impfungen im Abstand von 4 Wochen ▪ Schnellimmunisierung: 3 Impfungen an den Tagen 0,7,21 ▪ Auffrischung je nach Impfung ggf. nach mind. 6 Monaten ▪ Impfschutz: lebenslang
	Hepatitis A + B		1) 2) 3)	▪ Grundimmunisierung: 2 Impfungen im Abstand von 4 Wochen ▪ Schnellimmunisierung: 3 Impfungen an den Tagen 0,7,21 ▪ Auffrischung jeweils nach mind. 6 Monaten ▪ Impfschutz: lebenslang
X	Japanische Enzephalitis	Auswahl	1) 8.1.26 2) 3) 5.2.26	▪ Grundimmunisierung: 2 Impfungen an den Tagen 0,7 (Kinder 0,28 oder off label auch 0,7), ▪ Auffrischung frühestens nach 1 Jahr ▪ Impfschutz: mind. 14 Jahre
X	Tollwut		1) 8.1.26 2) 15.1.26 3) 29.1.26 4) (ggf. 5.2.26)	▪ Grundimmunisierung: 3 Impfungen an den Tagen 0,7,21 (auch Tg. 0,3,7 oder Tg. 0,7), Auffrischung nach frühestens 1 Jahr ▪ Impfschutz: wahrscheinlich lebenslang, jedoch ein- bis zweimalige Auffrischung nach Kontakt mit tollwutverdächtigem Tier empfohlen (unmittelbar, falls nur nach dem Schema Tg. 0,7 geimpft wurde)
	FSME		1) 2) 3)	▪ Grundimmunisierung: 2 Impfungen im Abstand von 2-4 Wochen ▪ Auffrischung nach frühestens 6 Monaten ▪ Impfschutz: mind. 10 Jahre
	Cholera & ETEC		1) 2)	▪ Schluckimpfung; Totimpfstoff 2 Impfdosen im Abstand von mind. 1 Woche oder Lebendimpfstoff 1 Impfdosis (nur Schutz gegen Cholera) ▪ Impfschutz: 2 Jahre; **Kühl lagen!**
✓	Meningokokken – Meningitis ACWY	2.3.23		▪ Eine Injektion ▪ Impfschutz mind. 10 Jahre, für Mekkapilger Booster nach 5 Jahren
X	Meningokokken – Meningitis B		1) 2)	▪ Zwei Injektionen im Abstand von 4 Wochen bzw. 6 Monaten abhängig vom Impfstoff, (3 Injektionen im 1. LJ) ▪ Impfschutz mind. 10 Jahre
	Influenza			▪ Saisonale Grippe: einmal pro Saison ▪ Impfschutz: 1 Jahr
	Pneumokokken			▪ 20- oder 21-valenter Konjugatimpfstoff, ab 60 Jahren oder Risikogruppen ▪ Einmalige Impfung, Impfschutz: mind. 10 Jahre
	RSV			▪ Einzelimpfung ab 60 Jahren oder Risikogruppen
	Gürtelrose (Zoster)			▪ Totimpfstoff: Zweimalige Impfung ab 50. LJ, Abstand 0,8 Wochen ▪ Zugelassen ab 18 Jahren für Risikogruppen ▪ Impfschutz mind. 10 Jahre, vermutlich deutlich länger
	HPV		1) 2)	▪ Zwei (bis drei) Injektionen im Abstand von 0,(2,)6 Monaten
	MPox		1) 2)	▪ Lebendimpfstoff, zwei Injektionen im Abstand von 0, 4 Wochen ▪ Ab 12 Jahren
	Harnwegsinfektion		1) 3) 2) 4)	▪ Grundimmunisierung: 3 Impfungen an den Tagen 0,14,28 ▪ Auffrischung nach frühestens 12 Monaten, Schutz 60-82% laut Studien

Notizen: